observation du Sieur Trecourt chirurgien major
de l'hopital militaire de La Ville de Rocroy
cy devant du Regt de cavalerie de Vogué.

Au mois de Mars 1744 un cavallier du Regt. d'Egmon
tombant de cheval se cassa La cuisse a la partie
moyenne du femure, il fut porté a l'hopital de Rocroy
cette fracture fut ~~prise~~ reduite comme ~~une~~ fracture
oblique comme elle l'etoit en Effet. au bout de 40 jours
il commença a marcher avec des Bequilles, sans ressentir
aucune douleur. il Luy survint au bout de 45 jours
de sa fracture (Et le troisieme de mon exercice en qualité
de chirurgien Major dudit hopital) une fievre maligne
qui fut traitée avec toute Les attentions possible, san
quil parut a La partie fracturée ny gonflement ny
inflamation; cette Maladie qui fut jugée mortelle ~~par~~
dans son commencement (a cause des convultions & sourdité
extraordinaire) emporta Le malade Le 14e. de sa maladie
je Le fit ouvrir comme cest mon ordinaire pour
decouvrir La cause d'une si facheuse fin; je ne remarquay
qu'un Lobe du poumon abcedé, L'autre etant fort sain &
dans son Etat naturel. je decouvrit le femur sans autre
raison que par curiosité puisque Le malade ne s'etoit
jamais plaint de sa cuisse dans Les ~~les~~ tems de cette derniere
maladie; Le premier coup de scapel donné il est inconcevable
L'odeur fetide qui ce fit remarquer, ayant continué La
disection je remarquay que les muscles etoint fort
alteré, je fit detacher Le femure de ses articulations, je
fut surprit de voir La grandeur de cette fracture dans une
chute si peu considerable; plusieurs pieces qui paroissoient

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

auoir été separée du Corp de Lós dans le tems de La fracture, & reunie dans Delay de La reduction; je remarquay une fente considerable depuis La partié moyenne du femur jusqua ses Condiles, cette fente setoit ecartée par le moyen d'une portion de lextremité superieur qui etoit fichée dans La cavité de Lextremité inferieur, de sorte que cette fente peut permettre d'y introduire Le doigt auriculaire dans toute sa Longueur & par consequent La sortie de La Moelle qui fut trouvée confondüe avec La matiere purulente & fetide qui inondoit cette partie Le perioste s'étant trouvé entierement detruit

cette observation est digne de remarque par sa grandeur vüe La simplicité de La cause, & La destruction des muscles & du perioste sans aparance manifeste, comme douleur, inflamation, & tention, qui precede ordinairement de pareille supuration, ce malade ayant été sans fievre du jour de sa fracture jusquau 55^e^ que La fievre maligne sest declarée comme jay dit.

jay crue que cette observation ne deplairoit pas a Lacademie Royal de chirurgie en attendant que La pratique de mon hopital men fournisse de plus considerable que je ne menqueray pas de presenter a cet illustre assemblée

a Rocroy Le 14^e^ octobre 1744

Trecourt